

Scheda: *Plagiolepis pygmaea*

Scritto da Diana Bonetta

Giovedì 03 Marzo 2011 12:29 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Aprile 2013 14:46

Taglia delle operaie: 1-2 mm

Taglia delle regine: 3 mm

Ginia: poliginica

Nidi naturali: prevalentemente nel terreno, nidi non troppo profondi, colonizzano soprattutto gli strati superiori del suolo, più aridi.

Nidi artificiali: nido in gesso, nido verticale scavabile

Temperatura ottimale: 25 °C

Umidità ottimale: fornire un gradiente con aree umide e aree più secche (30-80%): le formiche si sposteranno a seconda delle esigenze della covata.

Alimentazione naturale: melata prodotta da afidi, nettare floreale, collemboli

Alimentazione artificiale: dieta Bhatkar, insetti di piccole dimensioni (collemboli a parte, è sconsigliato offrire insetti vivi a questo genere di formiche), acqua e zucchero di canna, acqua e miele, latte e miele.

Periodo di ibernazione: in natura coincide col periodo invernale, in cattività non è necessario

Temperatura di ibernazione: 10 °C

Scheda: *Plagiolepis pygmaea*

Scritto da Diana Bonetta

Giovedì 03 Marzo 2011 12:29 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Aprile 2013 14:46



Scheda: *Plagiolepis pygmaea*

Scritto da Diana Bonetta

Giovedì 03 Marzo 2011 12:29 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Aprile 2013 14:46

