Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: *Lasius niger*

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che findano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).

Regina: 9mm

Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.

Formicai in natura Creano formicai preferibilmente nella terra. Spesso usano sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole per tenervi sotto le pupe che richiedono più calore e umidità minore.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.

Difficoltà: Molto semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze.

Indole: Combattive e territoriali si difendono valorosamente anche contro le specie più grandi puntando ad un vantaggio numerico.

Periodo di sciamatura: Dalla fine di Giugno fino agi inizi di Settembre.

Tipo di fondazione: Claustrale. Può a volte fondare per pleometrosi, cioè più regine fondano insieme. Quando poi la colonia crescerà, le operaie uccideranno tutte le regine eccetto una.

Lasius niger è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un annno si riescono ad avere centinaia di individui.

In cattività può vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in

gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.

(Colonia di *Lasius niger* con regina)