

Scheda: Camponotus fallax

Scritto da Luca Bosetti

Venerdì 10 Giugno 2011 22:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Giugno 2017 22:38

Areale di distribuzione: Ampiamente diffusa, soprattutto nelle zone mediamente calde, arboricola.

Nome scientifico: *Camponotus fallax*

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica.

Regina: 9,5 - 10,5 mm

Maschio: 6,5 - 7,5 mm

Operaie minor: 4 - 6 mm.

Operaie major: 7 - 9 mm

Colore: Nero lucido.

Scheda: Camponotus fallax

Scritto da Luca Bosetti

Venerdì 10 Giugno 2011 22:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Giugno 2017 22:38

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni viventi solitamente sul legno marcescente.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: 30-40%

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Indispensabile.

Formicai in natura Prettamente arboricole, creano formicai piccoli costituiti di poche stanze in rami e tronchi marcescenti.

Formicai artificiali: Preferibilmente formicai in legno.

Difficoltà: Media

Indole: Molto pacifiche e timide. Raramente si scontrano con altre specie.

Periodo di sciamatura: Aprile.

Scheda: *Camponotus fallax*

Scritto da Luca Bosetti

Venerdì 10 Giugno 2011 22:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Giugno 2017 22:38

Tipo di fondazione: le regine possono fondare in maniera claustrale, ma può essere utile nutrirle durante la fondazione ed eventualmente fornire bozzoli della stessa specie.



Scheda: *Camponotus fallax*

Scritto da Luca Bosetti

Venerdì 10 Giugno 2011 22:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Giugno 2017 22:38

